

Nom : _____

Numéro permis : _____

Questions :

1. Lors d'une nécropsie, les ruminants sont examinés :
 - a) En décubitus latéral droit
 - b) En décubitus latéral gauche
 - c) En décubitus dorsal
 - d) Selon la position où ils sont retrouvés.

2. Vrai ou faux.
Il n'est pas nécessaire de sortir les organes des cavités lors de la nécropsie et il est préférable de les examiner en place.
Vrai _____ Faux _____

3. Le volume pièces prélevés / volume de formol qui permet une bonne fixation est de :
 - a) 1 : 1
 - b) 1 : 2
 - c) 1 : 5
 - d) 1 : 10

4. Lequel des énoncés suivants concernant les avortements est inexact :
 - a) Il est nécessaire de fournir des sérums pairés de plusieurs vaches qui ont ou non avorté.
 - b) La nécropsie complète du fœtus permet d'établir un diagnostic dans un grand pourcentage des cas.
 - c) Du placenta devrait toujours prélevé même s'il est contaminé par des fèces.
 - d) Dans la majorité des cas, peu de changements significatifs sont observés à l'œil et au microscope.

5. Laquelle des affirmations suivantes est inexacte?
 - a) La nécropsie doit être orientée selon la liste des diagnostics différentiels.
 - b) L'absence de lésion musculaires lors de la nécropsie permet d'éliminer la possibilité de myopathie nutritionnelle.
 - c) Les avortons présentent rarement des lésions spécifiques d'une infection par un agent causal.
 - d) Un rapport de nécropsie devrait être rédigé et soumis en même temps que les pièces au laboratoire.
 - e) Les pièces soumises en bactériologie doivent être dans des contenants individuels.

6. Vous faites la nécropsie d'une génisse et vous observez des lésions de pneumonie purulente qui affectent le tiers antérieur des poumons. Quels prélèvements devraient être effectués idéalement?
 - a) Deux sections de poumons envoyées en bactériologie seulement étant donné qu'il y a une pneumonie purulente.
 - b) Plusieurs sections de poumons réfrigérées et plusieurs sections fixées dans le formol.
 - c) Le poumon en entier, congelé.
 - d) Trois à quatre sections de poumons dans le formol uniquement, pour vérifier la nature de la pneumonie.
 - e) Une écouvillon de la trachée et deux sections de poumons formolées.